

Kodning af testis tumorer hos voksne (≥ 15 år/postpubertale mænd)

Alle patoanatomiske diagnoser fra voksne patienter med malign germinalcelletumor i testis overføres fra patobanken til Dansk Testis Cancer database (DaTeCaData), som er en del af den fælles uroonkologiske database i regi af den uroonkologiske Danske Multidisciplinære Cancer Gruppe (DMCG) Dansk Urologisk Cancer Gruppe (DUCG).

Det anbefales, at alle patoanatomiske undersøgelser med germinalcelletumor hos voksne kodes på følgende måde:

T for topografi

T78010 Højre testis

T78020 Venstre testis

T7830A Rete testis, højre

T7830B Rete testis, venstre

T7840A Tunica vaginalis testis, højre

T7840B Tunica vaginalis testis, venstre

T78500 Paratestikulært væv (bløddelsvæv uden for testis distalt for funiklen eksklusiv rete testis)

T79110 Højre epididymis

T79120 Venstre epididymis

T79310 Højre funiculus spermaticus

T79320 Venstre funiculus spermaticus

T for topografisk lokalisation af ekstragonadal germinalcelletumor (f.x. mediastinum)

M for morfologi

*Ved blandet malign germinalcelletumor angives alle tumortyperne kodemæssigt i hyppighedsrækkefølge med hyppigste type først og Æ-kode for procentdel for hver komponent kodes (ÆK00**)*

Ved multifokalitet kodes ved blandet malign germinalcelletumor alle tumorkomponenter med procentfordeling efterfulgt af Æ-koden for multifokal (ÆYYY96). Tilsvarende kodes for multifokal ved tumor af en type.

M49001 fokal fibrose

bruges for fibrøst ar/scar

M90642 germinalcelleneoplasi in situ

M90613 seminom

M90653 seminom med syncytiotrofoblast

M90633 spermatocytisk tumor

M90663 spermatocytisk tumor med sarkom

M90703 embryonalt karcinom

M90713 blommesækstumor

M908B3 teratom

M90843 teratom med somatisk malignitet

M91003 koriokarcinom

Kodning ved teratom, præpubertal type, hos voksne

M908C0 epidermoidcyste

M90840 dermoidcyste

M908B3 teratom efterfulgt af MÆ0024 Se tekst (se nationale retningslinjer).

M for andre neoplasier fx. anden type trofoblasttumor eller sex-cord-stromal tumor
se den danske SNOMED/WHO.

M for morfologi vedr. rete testis, idet spredning hertil ikke fremgår af pT-stadiet

M9xxx4 tumortype, direkte spredning

M90642 germinalcelleneoplasi in situ (ved pagetoid spredning til rete testis)

M09450 ingen tegn på malignitet

M for morfologi vedr. epididymis og paratestikulært væv (bløddelsvæv uden for testis distalt for funiklen eksklusiv rete testis), også selvom det fremgår af pT-stadiet

M9xxx4 tumortype, direkte spredning

M09450 ingen tegn på malignitet

M for morfologi vedr. funiculus spermaticus

M9xxx4 tumortype, direkte spredning

M35410 tumorembolus

(hvis tumorvæv i kar sv.t. funiklen)

M9xxx6 tumortype, metastase

M09450 ingen tegn på malignitet

M09400 resektionsrande frie (inkluderer tumoremboli i kar hvis resektionsranden er *uden* indvækst i omgivende bløddelsvæv)

M09401 resektionsrande ikke frie (ved tumorinfiltration i bløddelsvæv, enten direkte spredning eller metastase)

M for karinvasion, også selvom det fremgår af pT-stadiet

M09420 karinvasion ikke påvist

M09421 karinvasion påvist

M09422 karinvasion kan ikke vurderes (bør så vidt muligt ikke anvendes)

ÆTD for tumorstørrelse (ved multifokalitet kodes diameter af største tumorfokus)

ÆTDxxx tumordiameter xxx mm

Æ-kode for pT(NM)-stadium (gælder kun for maligne germinalcelle tumorer)Modificeret *TNM UICC 8. udgave, se de nationale retningslinjer*

ÆF1820 pT0 Ingen tegn på primærtumor

ÆF1810 pTis Germinalcelleneoplasi in situ

ÆF1830 pT1* Tumor begrænset til testis og epididymis** uden karinvasion, tumor kan invadere tunica albuginea, men ikke tunica vaginalis

ÆF1840 pT2* Tumor begrænset til testis og epididymis med karinvasion, eller tumor gennemvokser tunica albuginea med involvering af tunica vaginalis

ÆF1850 pT3 Tumor invaderer funiklen med eller uden karinvasion

ÆF1860 pT4 Tumor invaderer scrotum med eller uden karinvasion

ÆF1870 pTx Stadium ikke fastlagt/kan ikke fastlægges

* Invasion af hilært/paratestikulært bløddelsvæv (bløddelsvæv uden for testis distalt for funiklen eksklusiv rete testis) er ikke nævnt i UICC TNM8, men skal opfattes som pT2.

**Invasion i epididymis uden invasion i hilært/paratestikulært bløddelsvæv (bløddelsvæv distalt for funiklen eksklusiv rete testis) eller karinvasion er yderst sjældent. I disse tilfælde repræsenterer epididymis invasion formentlig okkult involvering af bløddelsvæv/karinvasion og skal rapporteres som pT2.

M for resektionsrandenes forhold

M09400 frie resektionsrande

M09401 resektionsrande ikke frie
M90402 resektionsrand kan ikke vurderes

P for diagnostisk/kirurgisk procedure

P306X0 ektomipræparat

bruges ved orkiektomi

P306X4 tumorektomi

bruges ved testisbesparende kirurgi

P30610 biopsi

bruges ved biopsi fra kontralaterale testis

P30900 nålebiopsi

P30992 nålebiopsi, grovnål

P31060 finnålsaspirat

P30750 undersøgelse af materiale fra anden patologisk-anatomisk afdeling

bruges såfremt det er en revision/konsultation

Ved metastaser/metastasektomi

Txxxxx for topografi

M9xxx6 for morfologi

ÆF4630 udgangspunkt i testis

samt

M-kode for indgrebets radikalitet

såfremt det er muligt eller relevant

M09400 frie resektionsrande

M09401 resektionsrande ikke frie

M09402 resektionsrande kan ikke vurderes

Evt. P-kode for indgrebets art

Birgitte Grønkær Toft, patolog i DaTeCa

Birte Engvad, patolog i DaTeCa

Thomas Wagner, patolog (PhD-studerende) i DaTeCa

December 2019